

### Тест. Определение степени риска инсульта.

Вы курите?	Да/Нет
Вы принимаете инсулин?	
У Вас высокий холестерин?	
Вы принимаете лекарства по поводу высокого холестерина?	
Вы принимаете лекарства от высокого давления?	
У Вас есть диабет?	

Если Вы старше 55 лет и ответили "Да" на 2 и более вопроса, Вам необходимо обратиться к врачу, который даст Вам необходимые рекомендации. У Вас сейчас может быть не высокий риск, но врач может дать советы как снизить Ваш **риск возможного инсульта**.

Был ли у Вас когда-либо сердечный приступ, шунтирование или ангиопластика сосудов сердца?	Да/Нет
Было ли у Вас нарушение кровообращения в нижних конечностях?	
Было ли у Вас нарушение кровообращения в нижних конечностях?	
Был ли у кого-либо в Вашей семье инсульт?	
Говорил ли Вам доктор, что у Вас нарушение проходимости в шейных артериях?	

Если Вы ответили "Да" на любой из вышеперечисленных вопросов - у Вас высокий **риск инсульта**. Ранняя идентификация и лечение в большинстве случаев может многозначительно снизить или даже избежать возможного паралича или **смерти от инсульта**.

Был ли ранее у Вас Инсульт или ТИА?	Да/Нет
<b>Были ли у Вас когда - либо:</b>	
Слабость, онемение, паралич в нижних или верхних конечностях?	
Внезапное нарушение зрения, потемнение в глазах?	
Затруднение речи, произношения?	
Сильная головная боль, не связанная с другими причинами?	
Вы падали, теряли равновесие, что не было связано с другими причинами?	

Если Вы ответили "Да" на любой из вышеперечисленных вопросов, у Вас очень высокий **риск инсульта**. Большинство из этих случаев могут быть предотвращены. Вам необходимо обратиться к врачу для диагностики Вашего состояния и назначения лечения.

Источник: <http://www.insultanet.ru/article08.html>